

Modalità di raccolta del campione per GASTROPANEL

Il **gastropanel** è un test che consente di valutare la presenza di gastrite.

Il test deve essere effettuato a digiuno e il giorno prima dell'esecuzione del test il paziente non deve assumere alcolici.

Il paziente deve sospendere per almeno 15 giorni qualsiasi terapia farmacologica effettuata con antibiotici o farmaci che agiscono sulla secrezione gastrica, **salvo controindicazioni da parte del medico curante**. In particolare devono essere sospesi i seguenti farmaci:

- Tutti gli antibiotici
- Inibitori della pompa protonica (Omeprazolo, Pantoprazolo, Lansoprazolo, Rabeprazolo, Esomeprazolo). Nomi commerciali: ANTRA, AXAGON, ESOPRAL, LANSOX, LIMPIDEX, LOSEC, LUCEN, MEPRAL, NEXIUM, OMEPRAZEN, PANTECTA, PANTORC, PARIET, PEPTAZOL, SOTON.
- Antagonisti dei recettori H2 dell'istamina (Cimetidina, Ranitidina, Famotidina, Nizatidina, mRoxatidina,). Nomi commerciali: BIOMAG, BRUMETIDINA, CIMETIDINA TEVA, CRONIZAT, DINA, DOLILUX, FAMODIL, GASTRALGIN, GASTRIDIN, MOTIAX, NIZAX, RANIBEN, RANIBLOC, RANIDIL, ROXIT, STOMET, TAGAMET, TEMIC, ULCEDIN, ULCEX, ULCOMEDINA, ULIS, ZANIZAL, ZANTAC,
- Ranitidina Bismuto Citrato e Sali di bismuto. Nomi commerciali: DENOL, ELICODIL, PYLORID.
- Sucralfato. Nomi commerciali: ANTEPSIN, CITOGEL, GASTROGEL, SUCRAL, SUCRALFIN, SUCRAMAT, SUGAR, SUGAST, SURIL, ULCRAS.
- Antiacidi (Composti del magnesio, dell'alluminio, associazioni e complessi fra composti di alluminio, calcio e magnesio, Magaldrato). Nomi commerciali: CHIMODIL, FOSFALUGEL, GADRAL, MAALOX, MAGNESIA s. PELL., MAGRALIBI, RIOPAN.

Etichetta

Al momento del prelievo il medico dovrà raccogliere e riportare le seguenti informazioni:

- Motivo di esecuzione dell'esame: _____
- Pregresse endoscopie e risultato: _____
- Diagnosi pregressa di infezione da H. pylori ed eventuale terapia di eradicazione
- specificando le date: _____
- Terapia farmacologica recente (in particolare PPI): _____
- Diagnosi di malattie autoimmunitarie: _____

Il presente modulo va inviato alla UOC Medicina di Laboratorio – Azienda Ospedale-Università di Padova contestualmente al campione di sangue.