

Farmaci per i quali è richiesto il controllo del tempo di prelievo

FARMACO	TEMPISTICA DEL PRELIEVO
Acetaminofene (Paracetamolo) Acido acetilsalicidico	Valutazione tossicità: 4 h dall'assunzione Valutazione tossicità: 6 h dall'assunzione
Amicacina Gentamicina Vancomicina	A valle: prima dell'assunzione Al picco: - per infusione di 1 h = alla fine dell'infusione - per infusione di 30 min = 30 min dalla fine dell'infusione - per I. M. = dopo 1 h
Acido valproico Aloperidolo Alprazolam Amiodrone, Desetil-Amiodarone Aripiprazolo, Deidro-Aripiprazolo Atenololo Bisoprololo Brivaracetam Bromazepam Carbamazepina Citalopram, N-Desmetilcitalopram Clobazam Clomipramina Clonazepam Clozapina, Norclozapina Chinidina Desametasone Diltiazem Diazepam Disopiramide Etosuccimide Everolimus Felbamato Fenitoina Fenobarbital Flecainide Flunitrazepam Fluoxetina, Desmetilfluoxetina Furosemide Gabapentin Idrochinidina Lacozamide Lamotrigina Levetiracetam Lidocaina Lorazepam Lormetazepam	A valle: prima dell'assunzione

Lurasidone	
Metoprololo	
Mexiletina	
Micofenolato	
Midazolam	
Mirtazapina, N-Desmetil-Mirtazapina	
Nitrazepam	
Norclobazam	
Norclomipramina	
Norclozapina	
Nordiazepam	
Olanzapina, N-Desmetil-Olanzapina	
Oxazepam	
Oxcarbazepina	
Perampanel	
Primidone	
Propafenone	
Propranololo	
Quetapina, Norquetapina	
Risperidone, 9-Idrossi-Risperidone	
Rufinamide	
Sertralina, N-Desmetil-Sertralina	
Sirolimus	
Sotalolo	
Tacrolimus (FK506)	
Teicoplanina	
Temazepam	
Teofillina	
Topiramato	
Triazolam	
Venlafaxina, O-Desmetil-Venlafaxina	
Verapamil	
Vigabatrina	
Zonamide	
Litio	Almeno 12 h dall'assunzione
Digossina	Almeno 8 h dall'assunzione
Ciclosporina	A valle: prima dell'assunzione
Ciclosporina a 2 h	A 2h dall'assunzione
Methotrexate (MTX)	- 24 h, 48 h e 72 h dopo infusione ad alto dosaggio - 30 min e 2 h dopo terapia a basso dosaggio

Preparazione	M. Marinova
Verifica	Responsabile della Qualità: L. Sciacovelli
Approvazione	Direttore: D. Basso
Rev 06	Data 27/05/2022